

# ആദായകരമായ ആട്ടവളർത്തൽ



മാം ഇൻപർഫേഷൻ ബ്യൂറോ  
കേരള സർക്കാർ

## **ആദായകരമായ ആടുവളർത്തൽ**

ചീഫ് എഡിറ്റർ	:	എ.എം. സുനിൽ കുമാർ എൻസിപ്പിഎൽ ഇൻഫോമേഷൻ ഓഫീസർ
കടപ്പാട്	:	ഡോ. ആർ. വേണുഗോപാൽ അസി. ഐറോക്ടർ, മൃഗസാരക്ഷണ വകുപ്പ്
സമാഹരണം	:	ഡോ. ബി.എൻ. ബാബുരാജ് എഡിറ്റർ, ഫാം സ്റ്റേറ്റ്
എഡിറ്റർ	:	എലിസബത്ത് ജോർജ്ജ് പബ്ലിക്കേഷൻ ഓഫീസർ
ലോ ഒന്റ്	:	ദീപക് മാത്താടിൽ

ഫാം ഇൻഫോമേഷൻ ബുഡ്ഗോ പ്രസിദ്ധീകരണം

## ആദായകരമായ ആട്ടവളർത്തൽ

മനുഷ്യസമൂഹവുമായി ഏറ്റവും അധികം ഇണങ്ങി വളർന്ന മുഗ്ഗങ്ങൾ ഒന്നാണ് ആട്. വൈവിധ്യമാർന്ന പരിസ്ഥിതികളോട് ഇച്ചുകിഴുരാ നൃത്ത കഴിവും അതോടൊപ്പും പരിമിതമായ ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളിൽ മെച്ച പെട്ട ഉത്പാദനം ലഭിക്കുവാനുള്ള സാധ്യതകാണ്ഡും ആടു വളർത്തലിന് കേരളീയരുടെ ഇടയിൽ മുഖ്യസ്ഥാനം കൈവന്നിട്ടുണ്ട്. പാവപ്പെട്ട കർഷകരുടെ സാമ്പത്തിക പരിമിതികൾക്ക് അനുയോജ്യമായതുകൊണ്ട് ‘പാവപ്പെട്ട ഉറവുടെ പഴു’ എന്ന നിലയിൽ അറിയപ്പെട്ടുന്നു. ലഭിതമായ പാർപ്പിടം, കുറഞ്ഞ തീരുച്ചേലവ്, പോഷകമുല്പം അധികമുള്ള പാല്, വിലപിടിപ്പുള്ള ഇരിച്ചി, തുകൽ, ഉയർന്ന രോഗപ്രതിരോധ ശക്തി, ലഭിതമായ പരിപാലന മുറകൾ എന്നിവ ആട്ടവളർത്തലിന് അനുയോജ്യരംഭകങ്ങളാണ്. എന്നാൽ മെച്ചിൽ സമലഞ്ചൂടുടെയും പച്ചിലകളുടെയും അഭാവമാണ് ആട്ടവളർത്തലിന് ഇന്നൊരു പ്രതിസന്ധിയായി ഉയർന്നിരിക്കുന്നത്. വിള നശപ്പുകാർ എന്ന അപകീര്ത്തിയും ഈ സാധ്യമുശ്രയത്തിന് മറ്റാരു വെല്ലുവിളിയാണ്. മനുഷ്യനാൽ നശപ്പിക്കപ്പെട്ടുന്ന വന്ത്തിനും വിളകൾക്കും ആടുകളെല്ലാം പഴിചാരുന്നത് എന്നതാണ് വസ്തുത. 2007 ലെ സെൻസസ് പ്രകാരം 17 ലക്ഷം ആടുകൾ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തുണ്ട്.

### ജനുസ്സുകൾ

കേരളത്തിന്റെ തനതു ജനുസ്സാണ് മലബാറി അമവാ തലഫേരി ആടുകൾ. ഉത്തരകേരളത്തിലെ ജില്ലകളിലാണ് ഈ ധാരാളമായി ഉള്ളത്. നൂറാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് അരേബ്യൻ കച്ചവടക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന ആടുകളുടെയും മലബാറിലുണ്ടായിരുന്ന ആടുകളുടെയും സകരസന്തതികളാണ് ഇപ്പോൾ കണ്ടുവരുന്ന ‘മലബാറി’ ആടുകൾ എന്ന് കരുതപ്പെട്ടുന്നു. കറുപ്പ്, തവിട്ട്, വെളുപ്പ് എന്നീ നിരങ്ങളിലും ഈ നിരങ്ങൾ ഇടകലർന്നതുമായ നിരങ്ങളിലും മലബാറി ആടുകൾ കാണപ്പെടുന്നു. കഴുത്തിൽ തുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഉപാംഗങ്ങൾ സാധാരണ കണ്ടുവരുന്ന രൂപ ലക്ഷണമാണ്. ആണാടുകൾക്ക് ശരാശരി 40 കിലോഗ്രാമും പെട്ടാടുകൾക്ക് ശരാശരി 30 കിലോഗ്രാമും തുകമുണ്ടായിരിക്കും. ഇവയുടെ പ്രതിഭിന്ന ശരാശരി പാലുത്തപാദനം അര ലിറ്ററാണ്. ശരാശരി അഞ്ചു മാസം വരെ ഇവയുടെ കുടിക്കാലം നീണ്ടുനിൽക്കുന്നു.

മലബാറി ആടുകളെ കുടാതെ ഭാരതത്തിൽ കാണുന്ന പ്രമുഖ ആട്ടിൻ ജനുസ്സുകളാണ് ജമുനാപാർ, ബീറ്റൽ, ബാർബാറി എന്നിവ. കേരളത്തിൽ തന്നെ ആട്ടപ്പാടി മലബാറിവുകളിൽ കണ്ടുവരുന്ന ആട്ടപ്പാടി സ്ഥാക്ക് എന്ന തിനും ആടുകൾ മാംസാത്പാദനത്തിന് മെച്ചപ്പെട്ടവയാണ്.

ഇൻഡ്യയിലെ വലിപ്പം കൂടിയ ജനുസ്സുകളിൽ പ്രധാനിയാണ് ജമുനാപാർ. ഉത്തർപ്പേശ്വരിലെ ഇത്താവം, മധ്യര, ആഗ്ര എന്നീ ജില്ലകളിലാണ്

ഈവ ധാരാളമായി കണ്ണുവരുന്നത്. നല്ല ഉയരവും ശരീരവളർച്ചയും ഉള്ള ഈ ഇനങ്ങളിലെ മുട്ടനാടുകൾക്ക് 70 മുതൽ 90 കി.ഗ്രാം വരെയും പെൻ ആട്ടുകൾക്ക് 50 മുതൽ 75 കി.ഗ്രാം വരെയും ഭാരം കാണും. മുന്നിലേക്ക് തള്ളി നിൽക്കുന്ന വളർത്ത നാസികയും വളരെ നീണ്ട (30 സെ.മീ.വരെ) പാർശ്വങ്ങളിലേക്ക് തുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ചെവിയും ഇവയുടെ പ്രത്യേകതക ഭാണ്ട്. തുവെള്ളയോ, മഞ്ഞ കലർന്ന വെള്ളയോ നിറമുള്ള ഈ ആട്ടുകളുടെ ദേഹത്തിൽ ചുവപ്പോ, കറുപ്പോ നിറമുള്ള പുള്ളികളും കാണാറുണ്ട്. 240 ദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന കരവക്കാലത്തിനുള്ളിൽ 160 മുതൽ 200 ലി. വരെ പാൽ ഈവ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു.

ഈതുകുടാതെ കഷീരോത്പാദനത്തിനു പ്രസിദ്ധിയാർജിച്ച വിദേശ ജനുസ്സുകളായ സാനൻ, ആൽപെപൻ, എന്നീ ഇനങ്ങളും മലബാറി ഇനവും തമിലുള്ള സകര വർഷങ്ങളെയും കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല വികസിപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

കേരളത്തിൽ പ്രചാരത്തിലുള്ള വിദേശ ജനുസ്സുകളിൽ പ്രധാനി ‘സാനൻ’ ആണ്. ആട്ടുകളുടെ കുട്ടത്തിലെ ‘ഗവ്യരാണി’ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇവയുടെ ജനങ്ങേശം സ്വിറ്റ്‌സർലബ്സിലെ സാനൻ താഴ്വരയാണ്. തുവെള്ളയോ ഇളം ക്രീം നിറത്തിലേം കാണപ്പെടുന്നു. ചെവികൾ അല്ലപ്പെടുന്നവാൻ മുൻപോട്ടാൽ മുകളിലേക്ക് വളർത്തിരിക്കും. കൊന്ദുള്ളവയും ഇല്ലാത്ത വയും ഈ കുട്ടത്തിലുണ്ട്. ആണിനും പെൺഡിനും താടിയിൽ രോമം കാണും. 300 ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന കരവക്കാലത്ത് 900-1000 കി.ഗ്രാം പാൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിവുണ്ട്. ആൽപെപൻ, ആംഗ്രോനു ബിയൻ, അങ്കാറ എന്നീ ഇനങ്ങളും പ്രചാരത്തിലുണ്ട്.

### ആട്ടുകളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ

ആട്ടുകളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ അവയുടെ വർഗ്ഗശുഭ്യിയും ഗുണമേരുയും പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളുണ്ട്.

ഒരു നല്ല കരവയാടിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ പാലിഞ്ചേരി അളവ്, ശരീരത്തിന്റെ തുകം, വലിപ്പം എന്നിവ മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. പെൺഡാടുകളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ തള്ളയാടിഞ്ചേരിയും കുടുംബിനെ പെൺഡാടുകളുടെയും ഉത്പാദന പ്രത്യേകിപ്പാദനക്ഷമത കണക്കിലെ കുടേശവും അകിട്ടുകയും മാർദ്ദവമുള്ളതുമായ അകിട്ടുകയുടെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. ഒരു പ്രസവത്തിൽ ഓനിലധികം കുട്ടികൾ, അടുത്തുടർന്നുള്ള പ്രസവങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കു പ്രത്യേക പരിശീലന നൽകണം. മാംസാർപ്പാദനത്തിനുപയോഗിക്കുന്ന ആട്ടുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ശരീരതുക്കത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം.

പ്രജനന ആവശ്യത്തിനായി മുട്ടനാടുകളെ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ അവയ്ക്ക് നല്ല ശരിര പുഷ്ടിയും ഉള്ളംജസ്പാലതയും ഉണ്ടായിരിക്കണം. ലൈംഗിക രോഗങ്ങളോ അംഗവൈകല്യമോ ഉള്ള മുട്ടനാടുകളെ പ്രജനന തിന്ന് ഉപയോഗിച്ചുകൂടാ.

### പാർപ്പിടം ഒരുക്കൽ

സാധാരണയായി കേരളത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ ആടുകളെയും അവയുടെ കൂട്ടികളെയും മാത്രമായി കെട്ടിയിട്ടു വളർത്തുന്ന രീതിയാണ് കണ്ണുവരുന്നത്. കാർഷിക വിളകൾ സമിപ്പിക്കാതിരിക്കാനാണ് ഈ രീതി അവലംബിച്ചിരിക്കുന്നത്. വീടിനോട് ചേർന്ന 6 ച.മീറ്റർ വിസ്താരമുള്ള ഒരു ചായപിൽ രണ്ട് ആടുകളെയും അവയുടെ കൂട്ടികളെയും വളർത്താം. തന്നെ നിരപ്പിൽ നിന്ന് നേരമെറിറ്റ് ഉയരത്തിൽ മുള, പന, കമുക്, തെങ്ങ് എന്നിവ യുടെ തടിയുപയോഗിച്ച് പ്ലാറ്റ് ഫോം നിർമ്മിക്കേണ്ടതുണ്ട്. കാഷ്ഠം തന്നെ തിന്ന് പോകാനായി പലകകൾക്കിടയിൽ 3-4 സെൻ്റീമീറ്റർ വിടവുണ്ടായിരിക്കണം.

മുട്ടനാടിന്  $2.0 \times 1.5$  മീറ്ററും പെണ്ണാടുകൾക്ക്  $1.5 \times 1.5$  മീറ്ററും സൂലം വിസ്താരം ലഭിക്കണം. മേൽക്കുരയായി ഓലയോ ആസ്വബ്ദോഹം ഷീറ്റാം ഉപയോഗിക്കാം. കൂടിനുള്ളിൽ എപ്പോഴും ശുശ്വരായും വെളിച്ചുവും ലഭിക്കണം. ഇരുപ്പും നിലനിൽക്കാൻ പാടില്ല.

വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ പറമായി ആടുകളെ വളർത്തുമ്പോൾ 20 ആടുകൾക്കായി ഒരു കൂട് നിർമ്മിക്കാം. രാടിന് ഒരു ചതുരശ്രമീറ്റർ സൂലം ലഭിക്കണം. മുട്ടനാടിന്  $2.4 \times 1.8$  മീറ്റർ സൂലം ലഭിക്കുന്ന കൂടുകൾ പ്രത്യേക കമായുണ്ടാക്കണം. ആടിന്കുട്ടികൾക്ക് 0.3 ച. മീ എന്ന കണക്കിൽ സൂലം ലഭിക്കണം.  $1.8 \times 1.8$  മീറ്റർ വിസ്താരമുള്ള ഒരു മുറിയിൽ 10 കൂട്ടികളെ വളർത്താവുന്നതാണ്. ആടുപാമുകൾ തുടങ്ങുമ്പോൾ തീറ്റപ്പുൽ കൂഷി ചെയ്യാൻ സൗകര്യമുള്ള പ്രദേശങ്ങളാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത്. ഭൂനിരപ്പിൽ നിന്നും ഉയർന്ന പ്രദേശത്ത് കിഴക്കു പടിഞ്ഞാർ ദിശയിലായിരിക്കണം ഹാമി നുള്ള കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കേണ്ടത്. കൂടിഞ്ചേരു വരുമാനം മരംകൊണ്ടോ, സുഷിരങ്ങൾ തോടുകൂടിയ ഇഷ്ടികകൾ കൊണ്ടോ നിർമ്മിക്കാവുന്നതാണ്. കൂടിഞ്ചേരു ഒരു വശത്തായി ഒരു വാതിലും റാടിപ്പിക്കണം. ശുശ്വരലം കൂടിനുള്ളിൽ ലഭ്യമാക്കാനായി  $50 \times 20 \times 15$  സെ.മീറ്റർ വലിപ്പത്തിൽ തിരികെപ്പിൽ നിന്നും അൽപ്പം ഉയരത്തിലായി വെള്ളത്തൊട്ടികൾ നിർമ്മിക്കണം. ഇതോടൊപ്പം  $30 \times 20$  സെ.മീ വലിപ്പത്തിലുള്ള തീറ്റത്തൊട്ടികൾ കൂടിഞ്ചേരു വരുമ്പെട്ടിൽ സ്ഥാപിക്കണം.

### ആഹാര രീതി

ആട് അയവിറക്കുന്ന മുഗമാണ്. അതിന്റെ ശരീരവലിപ്പം കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ അതെ വലിപ്പമുള്ള ഒരു പശുകഴിക്കുന്നതിനേക്കാൾ കൂടു

തൽ തീറ്റ് ഭക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ആട്ടകളിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന വിവിധ തരം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ മേര അവയ്ക്കു കിട്ടുന്ന പോഷണത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു.

ആട്ടിൻകുട്ടികൾക്ക് ആദ്യത്തെ അബ്യുദയ ദിവസങ്ങളിൽ ദിവസേന 4 പ്രാവശ്യമെങ്കിലും പാല് നൽകണം. ഇങ്ങനെ ലഭിക്കുന്ന കനിപ്പും അവയ്ക്കു പ്രതിരോധ ശക്തി നേടിക്കൊടുക്കുന്നു. തുടർന്ന് ആദ്യത്തെ മാസം ആട്ടിൻകുട്ടിയുടെ ശരീരതുക്കത്തിന്റെ ആറിൽ ഒന്ന് എന്ന നിരക്കിലും രണ്ടാം മാസം എടിൽ ഒന്ന് ഭാഗം എന്ന നിരക്കിലും പാല് ആവശ്യമാണ്. രണ്ടാം പ്രായമെത്തുനോൾ മുതൽ ആട്ടിൻകുട്ടികൾ വരാഹാരം കുറേമുള്ള കൊടുത്ത് ശ്രീലിപ്പിക്കണം. ഒരു മാസം കൊണ്ട് ആട്ടിൻകുട്ടികൾ പുല്ലും ഇലകളും കഴിച്ചു തുടങ്ങുന്നു. മുന്നു മാസത്തിനുശേഷം പാല് നൽകേണ്ടതില്ല. ആട്ടകൾക്ക് ധാരാളം പച്ചിലകൾ ലഭ്യമാണെങ്കിൽ അത് ശരീര സംരക്ഷണത്തിനാവശ്യമായ ഫല്ലിപ്പോഷകങ്ങളും പ്രദാനം ചെയ്തുകൊള്ളും. ആട്ടകൾക്ക് പൂവ്, മുതികൾ, വേങ്ങ, കൈകി, പുരും മുതലായ വൃക്ഷ ഇലകളും ശിനി, നേപ്പിയർ, പാര എന്നീ പുല്ലിനങ്ങളും പയറുവർഗ്ഗത്തില്ലെങ്കും ചെടികളുടെ ഇലകളും നൽകാവുന്നതാണ്. ഉണക്കപ്പുല്ല്, വൈയ്ക്കോൽ, സൈലേജ് എന്നിവയും ആട്ടകൾക്ക് പദ്ധതിയാണ്. തീറ്റ് വളരെയധികം നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്ന സ്വഭാവമുള്ളതുകൊണ്ട് അതുപാതപമായും ഇടവിട്ടും ആയിരിക്കണം തീറ്റ് നൽകേണ്ടത്. സാധാരണയായി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പച്ചിലകളോടൊപ്പം വരാഹാരവും ആഹാരക്രമത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്താറുണ്ട്. പശുകൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന എല്ലാത്തരം കാലിത്തീറ്റകളും ആട്ടകൾക്ക് നൽകാവുന്നതാണ്. ശർഭിനിയായ ആട്ടകൾക്ക് 4-10 മാസം മുതൽ 200 ശ്രാം തീറ്റ് കുടുതലായി നൽകണം. കുവയുള്ള ആട്ടകൾക്ക് സംരക്ഷണത്തിനാവശ്യമായ തീറ്റയ്ക്ക് പുറമേ 1. കി.ശ്രാം പാലിന് 400 ശ്രാം തീറ്റ് എന്ന തോതിൽ അധികമായി നൽകണം.

ദിവസവും 2 നേരമായി വരാഹാരം നൽകുന്നതാണ് ഉത്തമം. കുവയുള്ള ആട്ടകൾക്ക് കുവയ്ക്കു മുമ്പായി തീറ്റ് നൽകണം.

ആവശ്യാനുസരണം ശുദ്ധജലം ആട്ടകൾക്ക് ലഭിക്കണം. പ്രായപൂർത്തിയായ രൈറിന് പ്രതിദിനം അബ്യു ലിറ്ററോളം ശുദ്ധജലം നൽകണം.

<b>ആട്ടകൾക്ക് നൽകാവുന്ന സാമ്പ്രതിഹാരം...</b>	<b>ഒരു മാസുകൾ</b>
നിലക്കെലപ്പിണ്ണാകൾ .....	25 ഭാഗം
തേങ്ങാപ്പിണ്ണാകൾ .....	10 ഭാഗം
തവിട് .....	22 ഭാഗം
ഉണക്ക മരച്ചിനി .....	10 ഭാഗം
മൺതേച്ചാളം .....	15 ഭാഗം
മുതിര / കടല .....	15 ഭാഗം
ധാതു ലവണ മിശ്രിതം .....	1 $\frac{1}{2}$ ഭാഗം
<b>ഇപ്പ് .....</b>	<b>1 <math>\frac{1}{2}</math> ഭാഗം</b>

## ആട്ടുകളുടെ തീറ്റക്രമം

പ്രായം	ഗരീര തുക്കം (കി.ഗ്രാം)	പാല് (മി.ലിറ്റർ)	സാന്ദ്രിത ആഹാരം (ഗ്രാം)	വൃക്ഷ ഇല ഗ്രാം
1-5 ദിവസം	1.5 -2	കനിപ്പാൽ	—	—
6-30 ദിവസം	2-3	300-500	അൽപം	അൽപം
30-60 ദിവസം	3-5	400-500	50-100	അൽപം
60-90 ദിവസം	5-7.5	350-500	100-150	250
90-120 ദിവസം	7.5-10	—	150-250	500
5-6 മാസം	10-15	—	250-300	750
6-12 മാസം	15-20	—	300-400	1-2 കി.ഗ്രാം
പ്രായപൂർത്തി യായ ആട്	25-30	—	200-300	2-3 കി.ഗ്രാം
കൊറ്റാട്ടാട്	30-40	—	300-500	3-5 കി.ഗ്രാം

## അരുട്ടായപ്പരിപാലനം

1. ആട്ടുകൾക്ക് തീറ്റ, വെള്ളം, എന്നിവ ശുചിയായ പാത്രങ്ങളിൽ നൽകുകു.
2. ആട്ടിൻകുട്ട് വൃത്തിയായും നനവില്ലാതെയും സുക്ഷിക്കുക.
3. ആട്ടിൻ കൂട്ടികൾക്ക് മാസം തോറും വിരമരുന്ന് നൽകുക.
4. ബാഹ്യപരാദങ്ങൾ (ചെള്ള, പേൺ) എന്നിവയെ നിയന്ത്രിക്കാൻ നടപടി കൾ കൈക്കൊള്ളുക.
5. കറക്കുന്നതിന് മുമ്പും പിസ്യൂം അകിട്ട് അണ്ണുനാശിനി/ലോഷനുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വൃത്തിയാക്കുക.
6. കൂളിപ്പുരോഗം, കൂരലുപ്പൾ എന്നീ രോഗങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രതിരോധ കൂത്രിവെച്ച് നടത്തുക.
7. ആഹാരക്രമത്തിൽ പെട്ടനുള്ള മാറ്റം ഒഴിവാക്കുക.
8. ആട്ടിൻകുട്ടികൾ ജനിച്ച ഉടൻതന്നെ അവയുടെ പൊക്കിൾക്കാടിയിൽ അണ്ണുനാശിനി പുരട്ടുക.

## ആട്ടുകളിലെ രോഗങ്ങൾ

വിരശല്യം, വയറിള്ക്കം, ശ്വാസകോശസംബന്ധമായ അസുവാങ്ങൾ, രക്താതിസാരം, വസുരി, ദെറുനസ് എന്നിവ സാധാരണയായി ആട്ടുകളിൽ കാണുന്ന രോഗങ്ങളാണ്.

വിരംബാധ അട്ടിൻ കുട്ടികളുടെ വളർച്ച തന്നെ മുടിപ്പിക്കുന്നു ആഹാരത്തോടുള്ള വിരക്കി, വയറിള്ളക്കം, ക്രമാതിരത്തമായി വയർ വിർത്തിനിക്കുക, താടിയുടെ അടിഭാഗത്ത് നീർവ്വീകം എന്നിവ വിരശല്യത്തിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. മാസം തോറും വിരമരുന്ന് കൊടുത്ത് വിരംബാധ നിയന്ത്രിക്കാവുന്നതാണ്.

ശ്വാസകോശത്തെ ബാധിക്കുന്ന നൃമോണിയ മുലം ശ്വാസകോശത്തെ മുക്കാലിപ്പ് ശക്തമായ പനി എന്നിവ ലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാവുന്നു.

കുടലിൽ ഉണ്ടാകുന്ന സുക്ഷ്മ പരാദബാധമുലമാണ് രക്താതിസാരം ഉണ്ടാകുന്നത്. വയറിള്ളക്കം, വിളർച്ച എന്നിവ ഈ രോഗത്തിന്റെ മുഖ്യലക്ഷണങ്ങളാണ്.

ആടുകളിൽ മുറിവുകൾ വേണ്ടവിധം ശ്രദ്ധിക്കാതിരുന്നാൽ അതിൽ കുടി അണ്ണുബാധയുണ്ടായി എറ്റന്ന് എന്ന രോഗം ബാധിക്കുന്നു ആയതിനാൽ മുറിവുകളുടെ പരിരക്ഷ പ്രധാനപ്പെട്ട് ഒന്നാണ്.

അകിടുവീകം, ശർച്ചൻഡ്രം എന്നി അസുഖങ്ങളും പശുകളിലെന്ന പോലെ ആടുകളിലും സംഖ്യാത്രികമാണ്. വൃത്തിയില്ലാത്ത കുട്ട്, പരിസരം, അകിടുവീകം ബാധയും ക്ഷയങ്ങൾ എന്നിവ അകിടുവീകരിക്കിന് കാരണമാകുന്നു. അകിടുവീകം ബാധിച്ച മുലക്കാനിൽ നീർവ്വീകം കാണുന്നു. പാലിന്റെ ഘടനയും നിറവും അപ്പാടെ വ്യത്യാസപ്പെടുന്നു. ഈരോടൊപ്പം വിശദപ്പില്ലാ



യുമും, പനി, കഷിംഗം എന്നീ ലക്ഷണങ്ങളും കാണാറുണ്ട്. അൻറീ ബയോ ടിക് മരുന്നുകൾ കുത്തിവെച്ചാണ് ഈ രോഗം ചികിത്സിക്കുന്നത്.

വയർ വീർക്കൽ അമവാ വയർപ്പെരുകം ആടുകളിൽ സാധാരണ കണ്ണുവരാറുണ്ട്. ആമാശയത്തിൽ വാതകങ്ങൾ കുടുതലായി ഉത്പാദിപ്പി ക്കപ്പെടുകയും അവയുടെ പൊതുസ്ഥിരത്തിൽ തടസ്സപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നോടാണ് ഇതുണ്ടാക്കുന്നത്. മരച്ചീനിയുടെ തളിരിലകൾ, രഘുവിലകൾ, വൈളളികൾ, ചക്രമടൽ എന്നിവ വിഴുങ്ങുന്നോൾ തൊണ്ടയിൽ തടസ്സം നേരിടുന്നതാണ് ഒരു കാരണം. അമിതമായി വയർ വീർക്കുന്നതു കൊണ്ട്, ശ്വാസോച്ചാസ തിന്റെ വിഷമം നേരിടുന്നു. ആട് ഉദരഭാഗത്ത് ചവിട്ടാൻ ശ്രമിക്കുക, കൂടു കൂടുവെ എഴുന്നേൽക്കുകയും കിടക്കുകയും ചെയ്യുക, വായിൽക്കൂട്ടി നൃയും പതയും വരുക, പല്ലു കടിക്കുക, നാകൾ പുറത്തേക്കിടുക എന്നിവ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. വേണ്ടവിധത്തിൽ ചികിത്സിച്ചില്ലെങ്കിൽ മരണപ്പെടുവാൻ സാധ്യ തയ്യാറാണ്. അതിനാൽ എത്രയും പെട്ടുന്ന് വിദ്യർഖ്യചികിത്സ ലഭ്യമാക്കുക.

ഒഹനക്കേട് ആടുകളിൽ സാധാരണ കാണപ്പെടുന്നു. അയവെട്ടാതി രിക്കുക, വയറുവേദനയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കുക, ഉമേഷമില്ലായ്മ, തീറ്റയിൽ വിരക്കി, ഉദരഭാഗത്ത് കട്ടിയുള്ള വന്നതു കിടക്കുന്നതുപോലെ തോന്നുക എന്നിവയെല്ലാം ഇതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ്. വയറ്റിൽ നിന്ന് പോകാ തിരിക്കുകയോ വയറിളക്കമോ കാണുന്നു. ആഹാരക്രമത്തിൽ പെട്ടുള്ള മാറ്റം, ക്രമത്തിലഡിക്കം ധാന്യങ്ങൾ, പഴകിയ ആഹാരപദാർത്ഥങ്ങൾ, ചക്രമടൽ, കമുകിൻപാളു, റബ്ബർ പാൽ എന്നിവ കഴിക്കുന്നത് ഇതിന് കാരണം കുന്നു.

വിരേചന ഒഴംഗം ഉത്തമമാണ്. ഒഹനക്കേട് എന്ത് ആഹാരം കഴിച്ച തുമുലമാണ് എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ചികിത്സ. റബ്ബർ പാല് കുടിച്ചയുട നേയാണൈക്കിൽ നേർപ്പിച്ച ഹോർമാലിൻ, ടർപ്പേറ്റിൻ, സോഡിയം ബൈ കാർബൺറ്റ്, സസ്യ എണ്ണകൾ എന്നിവ ഉള്ളിൽ കൊടുക്കുന്നത് പ്രയോജ നടപടമാണ്.

കഷിരസനി, കീറ്റോസിസ് എന്നീ ഉപാപചയരോഗങ്ങളും ആടുകളിൽ കണ്ണുവരുന്നു.

ആടുകളിൽ കണ്ണുവരുന്ന ഒരു പകർച്ചവ്യാധിയാണ് ആടുവസന്ത. ആടുകളുടെ മുവത്തും കീഴ്ചുണ്ടില്ലും വ്രണങ്ങൾ, വയറിളക്കം എന്നിവ തുക്കുപുറമെ ശ്വാസകോശത്തയും ഇള രോഗം ബാധിക്കുന്നു. വായിലെ വ്രണങ്ങൾ കാരണം ആഹാരം കഴിക്കാൻ സാധിക്കാതത്തിനാൽ മരണം സംഭവിക്കാം. വൈറൽ രോഗമായ ആടുവസന്തയെ പ്രതിരോധ കുത്തിവ ത്തു നൽകി തകയാവുന്നതാണ്.

### പ്രത്യുൽപാദനം

12 മുതൽ 15 മാസമെത്തുന്നോൾ പെണ്ണാടുകളെ ഇന്നചേർക്കാവുന്ന

താണ്. അതായത് 15 കി.ഗ്രാം തുകമെകിലും അവയ്ക്കുണ്ടായിരിക്കണം. പെൺഡകുകൾക്ക് 28 ദിവസത്തിലോരിക്കൽ മറിലക്ഷണങ്ങൾ പ്രകടമാകും. തുടർച്ചയായി വാൽ ആടുക, കരച്ചിൽ, അസാധ്യത, ജനനേത്രിയം തടിച്ചിരിക്കുക, അതിൽ നിന്നും ഫ്രോഷ്മദ്രാവകകം പോവുക എന്നിവയാണ് മറിലക്ഷണങ്ങൾ. മറിലക്ഷണം ഒന്നു മുതൽ രണ്ടു ദിവസം വരെ നീണ്ടു നിൽക്കാറുണ്ട്. മറിയുടെ രണ്ടാമത്തെ പകുതിയിൽ ഇണചേർക്കുന്നതാണ് ഉത്തമം.

- \* മുട്ടനാടുകളെ ഒന്നരവയല്ല പ്രായമെത്തുന്നോൾ ഇണചേർക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാം. നല്ല മുട്ടനാടുകളെ 5 മുതൽ 6 വർഷം വരെ പ്രജനനത്തിനുപയോഗിക്കാം.
- \* ആടുകളുടെ ശർഭകാലം അഞ്ചുമാസമാണ് പ്രസവത്തിന് ഒരു മാസം മുമ്പ് കരവ നിറുത്തണം.
- \* പ്രസവിച്ച് രണ്ട് മാസം കഴിയുന്നോൾ പെൺഡകുകൾ മറിലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കും. അപ്പോൾ വിണ്ടും ഇണചേർക്കാവുന്നതാണ്.



## പാലുത്പാദനം

വളരെയധികം പോഷകമുല്യങ്ങൾ നിറക്കുന്ന ഒന്നാണ് ആട്ടിൻ പാൽ. ഇതിലുള്ള കൊഴുപ്പും, മാംസ്യവും വേഗത്തിൽ ദഹിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ളതാണ്. കൂടാതെ കുടുതൽ വിറ്റാമിനൈകളും ധാതുവാണങ്ങളും ഇതിൽ അടഞ്ഞിയിട്ടുണ്ട്. ശർഭിണികൾക്കും കൊച്ചു കുട്ടികൾക്കും ഒഴംഗ്യമായി ആട്ടിൻ പാല് നൽകി വരുന്നു. ആട്ടിൻപാലിൽ ശരാശരി 4.5 ശതമാനം കൊഴുപ്പും 4 ശതമാനത്തോളം മാംസ്യവും അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

പശുവിൻ പാലിനെ അപേക്ഷിച്ച് ബഹർിംഗ് ശക്തി കുടുതലായതിനാൽ ആമാശയത്തിൽ അല്ലായിക്കുമുള്ളവർക്ക് ആട്ടിൻ പാല് ഒഴംഗ്യമാണ്. പശുവിൻ പാലിനോട് അലർജിയുള്ളവർക്കും ആട്ടിൻപാല് പദ്ധതിയാണ്.

ഡിവസവും രാവിലെയും വൈകിട്ടുമായി രണ്ടുനേരം ആട്ടിനെ കരക്കാം. ഇക്കാര്യത്തിൽ സമയക്കീപ്പത്ത് പാലിക്കുന്നത് നല്കാതാണ്. ചുരുത്തിയ പാല് കഴിവതും വേഗം കരിന്നെടുക്കണം. ആട്ടിൻപാല് മുഴുവനായി കരിന്നെടുക്കുന്നതും കരക്കാതെ മുഴുവനായി കുട്ടികൾക്കു വിടുന്നതും നന്നല്ല. കുട്ടികളുടെ ആവശ്യം കഴിഞ്ഞുള്ള പാല് കരിന്നെടുക്കണം. കരവയിൽ ശുചിത്വം പാലിക്കണം. കരവയ്ക്കുമുമ്പുനായി അകിട്ടും കാബും വൃത്തിയാക്കണം. കരവപാത്രങ്ങളും കരകുന്നയാളുടെ കൈകളും ശുചിയുള്ളതായിരിക്കണം. സംശ്രൂദ്ധമായ പാലുത്പാദനത്തിന് ഈത് ആവശ്യമാണ്.

## മാംസോൽപാദനം

ആട്ടിൻചീക്കു നമ്മുടെ നല്ല പ്രീയമാണ്. സംസ്ഥാനത്തെ മൊത്തതു മാംസോൽപാദനത്തിന്റെ 14 ശതമാനം ആട്ടിൻചീതിൽ നിന്നുമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. പ്രതിവർഷം 10 ലക്ഷത്തോളം ആടുകളെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് അഡിവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ കേരളത്തിൽ ആവശ്യമുള്ള ആട്ടിൻചീയുടെ ഒരു ഭാഗം മാത്രമേ നാമിവിടെ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ. ഒരു വയസ്സിനു താഴെയുള്ള ആടിന്റെ ഇരുച്ചിയാണ് കുടുതൽ സ്വാദിഷ്ഠം. ഇള്ളം ചുവപ്പുനിറമുള്ള ആട്ടിൻചീക്കു കൊഴുപ്പിന്റെ അംഗം കുറവാണ്.

## ആട്ടിൻ രോമാ

ഗുണമേരയും വലിപ്പവുമുള്ള ആട്ടിൻ രോമങ്ങളിൽ നിന്ന് രോമക്കുപ്പായം, കമ്പിളി എന്നിവ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. അങ്കോറ ആടുകളുടെ മേരയേറിയ രോമങ്ങൾ ‘മൊഹയർ’ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു. പാഷ്മിന രോമക്കുപ്പായം ഇൻഡോ ടിബെറ്റൻമേഖലയിലുള്ള പാഷ്മിന ആടുകളുടെ രോമുപയോഗിച്ച് ഉണ്ടാക്കുന്നവയാണ്.

കൂടാതെ ആടുകളിൽ നിന്നും കിട്ടുന്ന കാഷ്ഠം പശുവിൻ ചാണകത്തെക്കാൾ മെച്ചപ്പെട്ട ജൈവവളമാണ്. ഇതിൽ നേന്ത്രജീൻ, ഫോസ്ഫറിൻ എന്നിവ കൂടിയ അളവിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.

## ആരാധ്യരക്ഷാനപടികൾ

### 1. പ്രതിരോധ കുർത്തിവച്ചപ്പുകൾ

രോഗം	കുർത്തിവച്ചപ്പു നടത്തേണ്ട പ്രായം	കൊടുക്കുന്ന രീതി
കുളിപ്പുദിനം	6-8 ആഴ്ച പ്രായത്തിൽ ഓരോ 6 മാസം കൃടുബോൾ ആവർത്തിക്കണം	1.മി.ലി./എസ്.സി
കാലിവസന്ത	3-4 മാസം പ്രായത്തിൽ ഒന്നിടവിട്ടുള്ള വർഷം വിതം ആവർത്തിക്കണം	1. മി.ലി /എസ്.സി
അടപ്പൻ	3-4 മാസം പ്രായത്തിൽ ഓരോ വർഷവും ആവർത്തിക്കുക	0.5 മി.ലി/എസ്.സി
കുർലടപ്പൻ	-	
കരികാലി	-	
അടടുകളിലെ ഫുറോന്യൂമോൺഡ	6 മാസം പ്രായമാക്കുബോൾ 6 മാസം കഴിയുബോൾ ആവർത്തിക്കണം	
ആടുവസന്ത	6 മാസം പ്രായമാക്കുബോൾ ഓരോ വർഷവും ആവർത്തിക്കണം	1. മി.ലി /എസ്.സി

### 2. രോഗനിർണ്ണയ പരിശോധന

കഷയം	ഓരോ വയസ്സു കഴിയുബോധും
പരാക്ഷയം	വർഷത്തിലോരിക്കൽ
ബ്യൂസൈലോസിന്	വർഷത്തിലോരിക്കൽ

അവലംബം -

ശാസ്ത്രീയമായ ആടുഭളർത്തൽ, കേരള കാർഷിക സർവ്വകലാരാലി