കാർഷിക കാലാവസ്ഥ നിർദ്ദേശക ബുള്ളറ്റിൻ - പത്തനംത്തിട്ട ജില്ല

(ദക്ഷിണ മേഖലകാർഷിക ഗവേഷണകേന്ദ്രം വെള്ളായണിയും, ഭാരതീയ കാലാവസ്ഥവകുപ്പും സംയുക്തമായി നൽകുന്നത്)

നമ്പർ:PTA-AAS-35/2025, (69) തീയ്യതി: 29.08.2025

അടുത്ത 5 ദിവസത്തേക്കുള്ള കാലാവസ്ഥ പ്രവചനം

കാലാവസ്ഥ ഘടകങ്ങൾ	30/08/2025	31/08/2025	01/09/2025	02/09/2025	03/09/2025
മഴ (മില്ലി. മീറ്റർ)	25	5	4	5	3
ഉയർന്നതാപനില(° C)	29	29	29	29	29
കുറഞ്ഞതാപനില(° C)	24	24	24	24	24
കൂടിയഅന്തരീക്ഷആർദ്രത (%)	95	95	95	95	95
കുറഞ്ഞഅന്തരീക്ഷആർദ്രത(%)	80	80	80	80	80
കാറ്റിന്റെവേഗത (കിലോമീറ്റർ /മണിക്കൂർ)	3	3	3	2	3
കാറ്റിന്റെദിശ (ഡിഗ്രി)	270	270	320	340	320
മേഘവ്യാപ്തി(ഒക്ട)	8	8	8	8	7
കാലാവസ്ഥസംഗ്രഹം/അലേർട്ട്	ജില്ലയിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടസ്ഥലങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട്. കേരളത്തിൽ സാധരണയിൽ കൂടുതൽ തോതിലുമുള്ള മഴയ്ക്ക് സാധ്യത.				
പൊതു നിർദ്ദേശങ്ങൾ	ശരീരത്തിന്റെ നിർജലീകരണം തടയാൻ ഇടക്കിടക്ക്ധാരാളം ശുദ്ധജലംകുടിക്കുക.ബാഷ്പീകരണം കൂടുകയും വരണ്ടഅന്തരീക്ഷ സ്ഥിതി തുടരുന്നതിനാലും വിളകൾക്ക് ആവശ്യഘട്ടങ്ങളിൽ ജലസേചനം കൊടുക്കുകയും,മണ്ണിൽ ആവശ്യത്തിന് ഈർപ്പമുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുക.				

കാർഷിക കാലാവസ്ഥ നിർദ്ദേശങ്ങൾ

വിളകൾ	രോഗ-കീടങ്ങൾ	കാർഷിക / മൃഗസംരക്ഷണ നിർദ്ദേശങ്ങൾ
നെല്ല്	തണ്ടുതുരപ്പൻ	നെല്ലിൽ തണ്ടുതുരപ്പന്റെ മുട്ടക്കൂട്ടങ്ങളെ നശിപ്പിക്കാൻ ട്രൈക്കോഗ്രാമ ജപ്പോണിക്കം എന്ന മുട്ടകാർഡുകൾ 5c (ഒരു ഹെക്ടറിന്) പറിച്ചു നട്ടു 15 മുതൽ 30 ദിവസം കഴിഞ്ഞോ ഓരോ ആഴ്ച ഇടവിട്ടു ഉപയോഗിക്കാം. കൂടാതെ ഫിപ്രോനിൽ 0.3 G (5 കിലോഗ്രാം/ഏക്കർ) ശുപാർശ ചെയ്യുന്നു.
വാഴ	ബോറോണിന്റെ അഭാവം	വാഴയിലെ ബോറോണിന്റെ അഭാവം തടയാൻ ബോറാക്സ് (10 ഗ്രാം/ചെടി അല്ലെങ്കിൽ 4 കിലോഗ്രാം/ഏക്കർ) മണ്ണിൽ തളിക്കുക. ഉടനടി ഫലത്തിനായി ബോറാക്സ് (1 ഗ്രാം/ലിറ്റർ വെള്ളത്തിൽ) എന്ന തോതിൽ ഇലകളിൽ തളിക്കുക.
ചീര	ഇല കരിച്ചിൽ	ഇലകളിൽ വൈക്കോൽനിറത്തിലുള്ള പാടുകൾകാണുന്നു. രോഗംകൂടുന്നതോടെ പാടുകൾ കൂടിച്ചേർന്ന് ഇല പൊള്ളിയപ്പോലെ കാണുന്നു. ഇലകളിൽ വട്ടത്തിലുള്ള ദ്വാരങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നു. ഇതിനെ നിയന്ത്രിക്കാനായി 20 ഗ്രാം പച്ചചാണകം ഒരുലിറ്റർവെള്ളത്തിൽകലക്കി തെളിയെടുത്തതും 20 ഗ്രാം സ്യൂഡോമോണാസ് ഒരു ലിറ്റർവെള്ളത്തിൽകലക്കിയതും, ചേർത്ത് തളിക്കുക.
മൃഗസംരക്ഷണം		കന്നുകാലികൾക്ക് ധാരാളം കുടിവെള്ളം നൽകുക. ചൂട് കൂടുതലുള്ള സമയങ്ങളിൽ മേയുന്നത്

	ഒഴിവാക്കുക. ഷെഡിൽ ഫാനും ശരിയായ വായുസഞ്ചാരവും ഉറപ്പു വരുത്തുക.